

foto på barnet enl.
föräldrars tillåtelse

HANDLINGSPLAN

AKUTMEDICINER FÖR:

Namn och personnummer:.....

Namn/Telefon föräldrar/anhöriga

1.....

2.....

Vid intag eller misstanke om intag av allergiframkallande ämne:

t.ex.....

OCH

Lindrig reaktion Symtom: Hudutslag med klåda (nässelutslag) Klåda/rinnande ögon/näsa Svullnad klåda mun och svalg Svullna läppar/ögonlock	Åtgärd: 1. Ge antihistamin :..... mängd:..... Kontakta föräldrar/anhörig. Kontakta sjukvården om symtomen inte minskar och släpper. Om symtomen ökar, gå vidare med åtgärd enligt nedan.
Kraftig reaktion Är oftast en reaktion från flera organ samtidigt som kan var lindriga från början men snabbt kan förvärras. Symtom: Utbrett nässelutslag, kraftig rodnad och/eller svår klåda över stora delar av kroppen Ökande svullnad i mun och svalg med heshet eller svårt att tala Tydliga andningsbesvär: hosta, astma, eller andra andningssvårigheter Tilltagande magsmärtor och/eller kräkningar Kallsvett, blekhet Oro, ångest, tilltagande trötthet, medvetslöshet	Åtgärd: 1. Ge adrenalinpenna :..... Skall ges i lårets övre yttre muskel. Om dålig effekt kan denna dos upprepas efter 5-10 minuter 2. Var i stillhet, liggande med möjlighet att andas effektivt 3. Om astmasymtom (hosta, svårt andas) ge astmamedicin inhalera minst 2 doser. Om dålig effekt kan denna dos upprepas inom 5-10 minuter 4. Ring 112 efter ambulans, kontakta föräldrar/anhörig 5. Om ej redan tidigare gjort ge antihistamin: mängd:..... 6. Kortison (t.ex. Betapred) verkar ej akut och är därför ej viktigt initialt men kan nu ges i form av mängd: kan lösas i vatten

Ort Datum.....

Upptred lugnt! Lämna inte..... ensam!

Behandlande läkare:.....

Namnförtydligande samt arbetsplats inkl telefonnummer

.....

Barnakuten/tel:.....